

## Séance 6 : conversions

### I Multiples, sous-multiples et conversions simples

Tous les multiples et sous-multiples en gras sont à connaître par cœur : puissance de 10, nom et symbole. Les grands multiples à partir de méga prennent des majuscules. Ne pas confondre déci d et déca da. On retrouve la racine neuf dans nano.

$10^{-18}$	<b><math>10^{-15}</math></b>	<b><math>10^{-12}</math></b>	<b><math>10^{-9}</math></b>	<b><math>10^{-6}</math></b>	<b><math>10^{-3}</math></b>	<b><math>10^{-2}</math></b>	<b><math>10^{-1}</math></b>	<b><math>10^0</math></b>	<b><math>10^1</math></b>	<b><math>10^2</math></b>	<b><math>10^3</math></b>	<b><math>10^6</math></b>	<b><math>10^9</math></b>	<b><math>10^{12}</math></b>	$10^{15}$	$10^{18}$
atto	<b>femto</b>	<b>pico</b>	<b>nano</b>	<b>micro</b>	<b>milli</b>	<b>centi</b>	<b>déci</b>		<b>déca</b>	<b>hecto</b>	<b>kilo</b>	<b>méga</b>	<b>giga</b>	<b>téra</b>	péta	exa
a	<b>f</b>	<b>p</b>	<b>n</b>	<b>μ</b>	<b>m</b>	<b>c</b>	<b>d</b>		<b>da</b>	<b>h</b>	<b>k</b>	<b>M</b>	<b>G</b>	<b>T</b>	P	E

Exemples :  $2,4 \text{ mL} = 2,4 \cdot 10^{-3} \text{ L}$

$5,78 \text{ Gm} = 5,78 \cdot 10^9 \text{ m}$

Point méthode pour convertir (sur l'exemple des multiples et sous multiples du m)

Il faut maintenant s'habituer à ne travailler qu'en puissance de 10 et non plus avec un tableau à colonnes.

Convertir un nombre d'une première unité vers une seconde unité	Exemple traité : convertir A = 0,0120 cm en Mm	Exemple à traiter : convertir B = 1340 dm en nm
Mettre le nombre sous forme scientifique	$A = 1,20 \times 10^{-2} \text{ cm}$	
Mettre en évidence la première unité en ajoutant un $\times 1$ devant	$= 1,20 \times 10^{-2} \times 1 \text{ cm}$	
Remplacer le $\times 1$ suivi de la première unité en $\times 1 \times 10^n$ suivi de la seconde unité en trouvant n. <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Attention à ne surtout pas faire de conversion à l'envers à ce stade :</b> <i>réfléchir pendant 10 secondes pour se représenter mentalement si ce qui est écrit à gauche de l'égalité est « aussi grand » que ce qui est à droite ; dans le cas contraire, je modifie la puissance de 10 pour avoir une égalité juste</i></li> <li>Passer par l'intermédiaire des m au début de l'année</li> </ul>	$= 1,20 \times 10^{-2} \times 1 \times 10^{-2} \text{ m}$ Je me représente mentalement 1cm puis $1 \cdot 10^{-2} \text{ m}$ et je vérifie que c'est bien la même chose $= 1,20 \times 10^{-2} \times 10^{-2} \times 1 \text{ m}$ $= 1,20 \times 10^{-2} \times 10^{-2} \times 1 \times 10^{-6} \text{ Mm}$ Je me représente mentalement 1m puis $1 \cdot 10^{-6} \text{ Mm}$ et je vérifie que c'est bien la même chose	
Ecrire le nombre avec la nouvelle unité sous forme scientifique	$= 1,20 \times 10^{-2-2-6} \text{ Mm}$ $= 1,20 \times 10^{-10} \text{ Mm}$	
Je vérifie, par rapport au nombre de départ l'ordre de grandeur	L'odg est le même	

#### Exercice 1

Convertir et mettre sous forme scientifique

A = 48,9 cm en m

B =  $29,7 \cdot 10^6$  Gm en pm

C =  $3,9 \cdot 10^{-2}$  μm en cm

D =  $0,00048 \cdot 10^3$  μm en m

E =  $145 \cdot 10^5$  mg en kg

F =  $25,9 \cdot 10^{12}$  nm en Mm

G =  $0,045 \cdot 10^{-9}$  Tm en hm

H =  $0,68 \cdot 10^{-7}$  kg en cg

I = 23 a (ares) en ha (hectares)

#### Exercice 2

On désire connaître l'épaisseur e d'une feuille de papier. Pour cela on mesure l'épaisseur d d'un paquet de 500 feuilles et on trouve  $d = 5,50 \text{ cm}$ . Quelle est la valeur de l'inconnue en micromètres ?

## II D'autres unités à connaître

### 1) Tonne et quintal

La tonne (t) vaut  $1 \times 10^3$  kg (1000 kg) c'est-à-dire 1 Mg

Le quintal (Q) vaut  $1 \times 10^2$  kg (100 kg)

donc  $1t = 1 \times 10^6g$  et donc  $1g = 1 \times 10^{-6}t$

donc  $1Q = 1 \times 10^5g$  et donc  $1g = 1 \times 10^{-5}Q$

### Exercice 3

a) La production de pommes de terre du champ vaut  $A = 120 Q$  (quintaux !). Donner sa valeur en cg.

b) Un train a une masse de 87,80 t. Quelle est sa masse en dag ?

### 2) Des unités qui ne sont pas des puissances de 10

Il existe d'autres unités qui sont soit des unités anciennes, soit des unités plus adaptées pour l'étude de certains objets.

Par exemple, on utilise souvent l'année lumière (ou année de lumière) pour les distances dans l'univers. Par définition, il s'agit de la distance parcourue par la lumière en une année dans le vide.

$1 a.l. = 9,46 \times 10^{12} km$  et donc, directement, on peut écrire que  $1 km = \frac{1}{9,46 \times 10^{12}} a.l.$

On utilise aussi l'unité astronomique qui correspond à la distance moyenne entre la Terre et le Soleil.

$1 U.A. = 1,50 \times 10^8 km$  et donc, directement, on peut écrire que  $1 km = \frac{1}{1,50 \times 10^8} U.A.$

*Point méthode pour convertir ce genre d'unité ;*

Il faut suivre exactement toutes les étapes de la méthode vue en I. La différence est qu'il n'apparaît plus uniquement des puissances de 10 dans les conversions mais certains nombres et certains quotients.

### Exercice 4

Poser la conversion pour chacune des cases du tableau suivant et le remplir avec des ordres de grandeur.

	Distance en km	Distance en a.l.	Distance en U.A.
Distance D entre la Terre et Pluton			40
Distance D' entre la Terre et l'Amas de la vierge.	$3,4 \times 10^{20}$		
Diamètre D'' de la voie Lactée.		$1,2 \times 10^5$	

### Exercice 5

La livre romaine est une ancienne unité de masse. 1 livre romaine = 324 g.

Quelle est la masse, en livres romaines, d'une barre métallique ayant une masse m de 81,0 kg ?

### 3) Le passage des secondes en heures minutes secondes

*Rappel :* une heure est composée de 60 minutes. Une minute est composée de 60 secondes.

Ainsi  $1 h = 60 \text{ min}$  donc  $1 \text{ min} = \frac{1}{60} s$      $1 \text{ min} = 60 s$  donc  $1 s = \frac{1}{60} \text{ min}$

Il est souvent utile de convertir des heures en h min s ou des s en h min s

*Méthode pour convertir en h min s*

- Tout convertir en secondes dans un premier temps
- Faire une division euclidienne par 60 avec reste pour mettre le résultat sous la forme de min s
- Faire une deuxième division euclidienne du nombre de minutes par 60 avec reste pour trouver des h min et rajouter le reste des secondes de la première division
- Attention à un éventuel arrondi : 4,8 s se transforme en 5s si on demande à la seconde près.

### Exercice 6

La durée  $d_1$  vaut 1h49min32s. Quelle est la valeur de cette durée en s ?

La durée  $d_2$  vaut 1999 secondes. Quelle est la valeur de cette durée en h min s ?

La durée  $d_3$  vaut 7,420 h. Quelle est sa valeur de cette durée en h min s ?

La durée  $d_4$  vaut 12,40 h. La convertir à la minute près.

### III Unités dérivées plus complexes

#### 1) Surface

##### a) Rappel

Une surface de  $1 \text{ m}^2$  correspond à la surface d'un carré de 1m par 1m. Une surface de  $1 \text{ cm}^2$  correspond à la surface d'un carré de 1 cm par 1 cm etc. Se représenter mentalement ces surfaces simples.

##### b) Conversion des surfaces

Il faut éviter de faire des tableaux et raisonner en unités simples et en puissances de 10.

*Méthode pour la conversion des surfaces*

Convertir une surface d'une première unité vers une seconde unité	Exemple traité : convertir A = $42,70 \cdot 10^{-5} \text{ km}^2$ en $\text{cm}^2$	Exemple à traiter : convertir B = $1340 \cdot 10^{18} \text{ nm}^2$ en $\text{hm}^2$
Mettre le nombre sous forme scientifique	$A = 4,270 \times 10^{-4} \text{ km}^2$	
Mettre tout simplement l'unité de surface sous la forme d'un carré d'unités de longueur avec un $\times$ devant	$= 4,270 \times 10^{-4} \times (1\text{km})^2$	
Convertir chaque unité de longueur dans la nouvelle unité de longueur comme vu en I <ul style="list-style-type: none"> <li>en faisant surtout attention à ne pas se tromper de sens (réfléchir 10 s)</li> <li>en passant par les m au moins en début d'année</li> </ul>	$= 4,270 \times 10^{-4} \times (1 \times 10^3 \text{ m})^2$ Je me représente mentalement 1km puis $1 \cdot 10^3 \text{ m}$ et je vérifie que c'est bien la même chose $= 4,270 \times 10^{-4} \times (1 \times 10^3 \times 1\text{m})^2$ $= 4,270 \times 10^{-4} \times (1 \times 10^3 \times 10^2 \text{ cm})^2$ Je me représente mentalement 1m puis $1 \cdot 10^2 \text{ cm}$ et je vérifie que c'est bien la même chose	
Faire l'opération de la parenthèse au carré en faisant apparaître la nouvelle unité de surface	$= 4,270 \times 10^{-4} \times 10^{3 \times 2} \times 10^{2 \times 2} \text{ cm}^2$	
Réunir les puissances de 10	$= 4,270 \times 10^{-4+3 \times 2+2 \times 2} \text{ cm}^2$ $= 4,270 \times 10^6 \text{ cm}^2$	
Je vérifie, par rapport au nombre de départ l'ordre de grandeur	L'odg est le même	

#### Exercice 7

Convertir A =  $37,8 \times 10^{-6} \text{ dam}^2$  en  $\mu\text{m}^2$       B =  $3200 \times 10^{20} \text{ mm}^2$  en  $\text{Gm}^2$

#### Exercice 8

Un rectangle mesure 10,1 cm par 7 mm. Quelle est sa surface en  $\text{m}^2$  ?

#### 2) Volumes

##### a) Rappel

Un volume de  $1 \text{ m}^3$  correspond au volume d'un cube de 1m par 1m par 1m. Un volume de  $1 \text{ cm}^3$  correspond au volume d'un cube de 1 cm par 1 cm par 1 cm etc. Se représenter mentalement ces volumes simples.

##### b) Conversion des volumes en utilisant les $\text{m}^3$ et les dérivés

Il faut éviter de faire des tableaux et raisonner en unités simples et en puissances des 10. La méthode est exactement la même que pour les surfaces sauf que cette fois apparaîtront, pour chaque unité de volume, un produit de trois membres d'unité de longueur.

#### Exercice 9

Convertir A =  $57,0 \times 10^{-17} \text{ dam}^3$  en  $\text{pm}^3$       Convertir B =  $0,0000709 \times 10^{-2} \text{ mm}^3$  en  $\text{hm}^3$

##### c) Volume et capacité

Les volumes s'expriment en  $\text{m}^3$  et leurs dérivés. Les capacités s'expriment en L (litre, attention grand « L ») et leurs dérivées (mL, GL etc.). La correspondance à connaître par coeur est la suivante :  **$1 \text{ L} = 1 \text{ dm}^3$**

Il faut aussi se rappeler des correspondances suivantes qu'on pourra démontrer :

$$1 \text{ mL} = 1 \text{ cm}^3 \quad \text{et} \quad 1000 \text{ L} = 1 \text{ m}^3$$

Pour convertir par exemple des hL en  $\text{mm}^3$ , on passe par les L donc les  $\text{dm}^3$  puis les  $\text{mm}^3$ .

#### Exercice 10

Convertir A =  $34 \times 10^{-4} \text{ hL}$  en  $\text{cm}^3$  ;      B =  $57,0 \times 10^{-17} \text{ hm}^3$  en  $\mu\text{L}$  ;      C =  $389,8 \text{ daL}$  en  $\text{dam}^3$

## Les grosses bêtises à ne pas faire à l'issue de la séance 6 sur quelques exemples :

- Faire des conversions à l'envers comme  $1,1 \cdot 10^{-3} \text{ mm} = 1,1 \cdot 10^{-3} * 10^3 \text{ m}$
- Confondre le mm et le cm
- Ne pas maîtriser tous les multiples et sous-multiples
- Ne pas bien écrire  $\mu\text{m}$
- Faire des conversions à l'envers comme  $1,1 \cdot 10^{-3} \text{ mm} = 1,1 \cdot 10^{-3} * 10^3 \text{ m}$
- Ne plus savoir faire une division euclidienne par 60 avec reste
- Ne pas savoir ce que signifie  $\text{cm}^2$  ou  $\text{mm}^3$  par exemple
- Penser que  $1 \text{ L} = 1 \text{ m}^3$
- Penser que comme  $1 \text{ L} = 1 \text{ dm}^3$  alors  $10 \text{ L}$  vaut  $1 \text{ m}^3$  : on multiplie bien par 10 pour passer d'un multiple à un autre multiple des L mais par 1000 pour les  $\text{m}^3$

## A l'issue de la séance 6 :

- Je connais tous les points des séances précédentes
- Je connais tous les multiples et sous multiples
- Je sais appliquer parfaitement les différents points de la méthode pour faire des conversions simples
- Je me suis suffisamment entraîné pour les écrire au fil de la plume (donc rapidement mais sans me tromper)
- Je vois que pour les t et Q, il s'agit de la même méthode y compris pour les unités comme l'année de lumière ou l'unité astronomique sauf qu'il y a d'autres nombres que des puissances de 10 et des quotients qui apparaissent
- Je sais que si  $1 \text{ unitéA} = X \text{ unitéB}$  alors  $1 \text{ unitéB} = \frac{1}{X} \text{ unitéA}$  et je le fais automatiquement
- Je sais convertir les durées en h min s en posant des divisions avec reste ; je connais les règles sur les CS pour les durées.
- Je sais appliquer parfaitement les différents points de la méthode pour la conversion des unités de surface ou pour la conversion des unités de volume
- Je me suis suffisamment entraîné pour les écrire au fil de la plume (donc rapidement mais sans me tromper)
- Je sais que pour faire le lien entre les volumes ( $\text{m}^3$  etc.) et les capacités (L etc.), je suis obligé de passer par les  $\text{dm}^3$  et les L car la correspondance est  $1 \text{ dm}^3 = 1 \text{ L}$  (correspondance que je connais par cœur : je visionne 1L d'eau et je visionne un cube de côté 1 dm càd 10 cm : c'est bien la même chose)
- Je sais aussi utiliser la correspondance  $1 \text{ mL} = 1 \text{ cm}^3$  qui est pratique et je sais la démontrer.